

TRICHOMONIASIS

Información general

La infección por *Trichomonas* o “huermecec” es una infección, generalmente del buche, reconocida por los halconeros desde hace siglos. La ocasiona el protozoo flagelado “*Trichomonas gallinae*” y lo transmiten principalmente las palomas infectadas. Algunos factores predisponentes son una deficiencia de vitaminas, una nutrición inadecuada y/o una fuerte bajada de peso. Al principio es difícil detectar lesiones hasta que aparecen pequeños bultos blancos. La enfermedad puede llegar a producir grandes masas caseosas en la lengua, boca, coana y buche. En ciertas ocasiones infecciones agresivas pueden llegar a los huesos de la mandíbula y pico. Estas lesiones deben ser cuidadosamente retiradas, protegiendo el tejido subyacente, después del tratamiento. En algunos casos estas infecciones pueden afectar a los párpados y producir abundante inflamación que requiere de cirugía.

Causas de trichomoniasis

Ingestión de comida infectada, principalmente palomas.

Síntomas de las enfermedad

Lesiones blanquecinas en la boca, lengua.

Mal aliento.

Apetito alterado (no comen bien), tira la comida.

Vómitos.

Trichomoniasis en el buche de un Cernícalo vulgar.



Prevención

Suministrar las palomas sin buche después de haberlas congelado por al menos 24 horas.

Alimentar a las aves con comida de una fuente conocida.

Chequear la boca y lengua del halcón a diario.

Chequeos microscópicos del buche en el veterinario, especialmente antes y después de la muda y durante el periodo de caza.

Si la enfermedad no se detecta en una etapa temprana las masas caseosas pueden destruir irreparablemente el pico y la boca del halcón.

